

Chirurgické ukončení těhotenství v I. trimestru

Pacientka (štítek)

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Bydliště:

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vážená paní, slečno,

v předkládaném formuláři si přečtete informace o chirurgickém ukončení těhotenství. Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.

Co je chirurgická interrupce: Jedná se chirurgickou metodu umělého přerušení těhotenství (UPT). Podstatou je odstranění plodového vejce a vyprázdnění obsahu dutiny děložní.

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu: Chirurgická interrupce se provádí na základě Vaší žádosti (možné provést do 12. týdne těhotenství) nebo ze zdravotních důvodů.

Poplatek za interrupci, pokud je provedena na základě Vaší žádosti činí:

UPT do 8. týdne těhotenství Kč.

UPT do 12. týdne těhotenství Kč.

Jaký je režim pacientky před výkonem: Po dobu minimálně 6 hodin před výkonem nemůžete přijímat tekutiny, stravu a je zakázáno kouřit. O anestezii Vás bude informovat lékař – anesteziolog, který Vám může předepsat i podání tlumicích a zklidňujících léků v rámci předoperační přípravy.

Jaký je postup při provádění výkonu: Podstatou zákroku je vyprázdnění obsahu dutiny děložní. Výkon se provádí v celkové anestezii. Přístup k dutině děložní je pochvou a děložním hrdlem, přes které se zavádí kanyla a podtlakem se odsaje obsah dutiny děložní, následně může být připojena kontrola dutiny děložní kyretou. Doba trvání zákroku je 10–15 minut. Získaný materiál se posílá na histologické vyšetření.

Jaké jsou možné komplikace a rizika: Žádné pracoviště ani lékař Vám nemůže zaručit ideální a nekomplikovaný průběh operace. Všeobecné komplikace provázející operační výkony jsou díky pokroku v medicíně velmi ojedinělé.

Ke komplikacím, které vzácně provázejí všechny typy operací, patří např. trombóza (vytvoření krevních sraženin v žilách, např. dolních končetin), embolie (uzavření žil krevní sraženinou, nejčastěji v plicích), krvácení během operace s nutností podání transfuzních přípravků nebo alergická reakce na podávaná léčiva.

I přes pečlivou operační techniku může dojít během operace k perforaci (proděravění) dělohy pracovním nástrojem a poškození okolních orgánů (močový měchýř, střevo, cévy...) s nutností kontroly dutiny břišní laparoskopickým nebo laparotomickým přístupem.

I v této výjimečné situaci je naší snahou zachování všech vnitřních orgánů, zcela ojediněle je však nutné provést operační výkon s nutností odstraněním dělohy. Poškození okolních orgánů mohou vyžadovat specifická řešení, při poškození střeva například nutnost tzv. stomie – dočasného či trvalého vývodu střeva přes břišní stěnu, při poškození močového měchýře zašití a zavedení cévky do močové trubice po dobu hojení léze.

Z nejrůznějších medicínských důvodů může dojít k neúplnému vyprázdnění dutiny děložní (zůstávají zbytky plodového vejce). Toto se může projevit například zvýšeným krvácením, bolestmi, teplotami apod., pacientka však může být i zcela bez příznaků. V těchto případech je nutné výkon opakovat.

Možné následky u jinak nekomplikovaného výkonu mohou být: infekce v pochvě či děloze vyžadující antibiotickou léčbu, vzácně může dojít k oslabení menstruace, až úplné vynechání menstruace v důsledku pozánětlivých procesů nebo srůstů v dutině děložní. V některých případech je nutné tyto následky řešit následnou operací. Výjimečně se může po zákroku vyskytnout silné děložní krvácení s nutností opakování zákroku a kontroly dutiny děložní. Další možné komplikace mohou vzniknout při podání narkózy a budou Vám vysvětleny před operací lékařem – anesteziologem.

Jaký je režim pacientky po provedení výkonu: Po nekomplikovaném výkonu budete přeložena na standardní oddělení, kde budete 2 hodiny monitorována, po 2 hodinách již budete moci chodit, jíst a pít. Doba hospitalizace závisí na stavu pacientky, při nekomplikovaném průběhu a dobrém stavu pacientky se propouští po dvou hodinách od zákroku.

Při nekomplikovaném průběhu vytvoření nové děložní sliznice trvá obvykle 14 dní a bývá spojeno s drobným krvácením – z preventivních důvodů nejsou minimálně během prvních 14 dnů a po dobu krvácivých projevů doporučovány koupele, používání tampónů a pohlavní styk. Obvyklé pooperační bolesti trvají 1–2 dny, je možné jejich tlumení běžnými analgetiky. První menstruace se po výkonu dostaví za 4–6 týdnů. Pracovní neschopnost po propuštění z nemocnice není nutná.

Podle platné právní úpravy je plod po uměle přerušném těhotenství nebo potratu lidským pozůstatkem a takto je s ním předepsáno zacházet. Nemocnice zajistí jeho uložení po dobu 96 hodin od potratu nebo ukončení těhotenství. Během této doby můžete požádat o jeho vydání k pohřbení, které je upraveno zákonem o pohřebnictví.

Jaké jsou možné alternativy výkonu: Další možností umělého přerušení těhotenství v I. trimestru je nechirurgické (medikamentózní) ukončení těhotenství – možné provést do stáří těhotenství 6 týdnů a 6 dnů dle ultrazvukového vyšetření.

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měla jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměla. Lékařem jsem byla poučena o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

Prohlašuji, že mi byly sestrou/porodní asistentkou náležitě objasněny veškeré informace z hlediska ošetrovatelské péče vzhledem k provedenému lékařskému výkonu.

S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum:

Podpis pacientky nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře, který vysvětluje pohovor provedl

Razítko a podpis sestry/porodní asistentky, která vysvětluje pohovor provedla

Pacientka není schopna podpisu. Svůj souhlas vyjádřila:

popište způsob:

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře