

Použití přípravku s obsahem Misoprostolu

Pacientka (štítek)

Jméno a příjmení:

Rodné číslo:

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:

Datum narození:

Vážená paní,

bylo zjištěno, že se Vaše těhotenství nevyvíjí, nebo jste potratila plodové vejce jen částečně a v děloze zůstávají neodloučené části tkáně. V předkládaném formuláři si přečtete informace o použití přípravku s obsahem Misoprostolu.

Pomohou Vám připravit se na rozhovor s lékařem, který Vás bude informovat o navrhovaném postupu, abyste se mohla rozhodnout a dát souhlas k jeho provedení.

Co je nechirurgická (medikamentózní) cesta ukončení neprosperujícího těhotenství:

Jedná se o postup, jehož podstatou je odloučení a vypuzení plodového vejce z dutiny děložní na základě podání specifických chemických látek (ve formě tablet).

Jaký je důvod (indikace) tohoto výkonu:

Nechirurgické ukončení neprosperujícího těhotenství je alternativa k chirurgické metodě – revize dutiny děložní kyretou. Výhodou je vyhnutí se anestezii a invazivnímu výkonu.

Jaký je režim pacientky před výkonem:

Vzhledem k tomu, že se nejedná o invazivní výkon, není potřeba dodržovat speciální režimová opatření.

Jaký je postup při provádění výkonu:

Podstatou metody je podání chemických látek ve formě tablet, které vyvolají odloučení a vypuzení plodového vejce. Způsob podání a dávku preparátu určujeme dle doporučení Světové zdravotnické organizace (WHO) a obecně uznávaných mezinárodních protokolů. Jedná se o bezpečný preparát, který je velmi účinný a byl mnohonásobně testován ve velkých mezinárodních studiích.

Jaké jsou možné komplikace a rizika:

Vzhledem k mechanismu účinku podávaných látek mohou nastat především tyto komplikace:

- časté – nevolnost, zvracení, průjem, pocity horka
- ojedinělé – pocity dušnosti, dušnost, vysoký krevní tlak
- vzácné – infekce vnitřních pohlavních orgánů, ruptura dělohy, alergická reakce na daný preparát

Nedostatečné odloučení a vypuzení plodového vejce je možnou komplikací této metody a je třeba se na ni připravit. Této komplikaci nejde předejít žádným opatřením. Že došlo k nedostatečnému odloučení a vypuzení plodového vejce, se zjistí až při kontrolním vyšetření po 7 dnech od podání preparátu. Léčba této komplikace obvykle vyžaduje provedení instrumentální revize dutiny děložní v celkové anestezii.

Podle platné právní úpravy je plod po uměle přerušném těhotenství nebo potratu, lidským pozůstatkem, a takto je s ním předepsáno zacházet. Nemocnice zajistí jeho uložení po dobu 96 hodin od potratu nebo ukončení těhotenství. Během této doby můžete požádat o jeho vydání k pohřbení, které je upraveno zákonem o pohřebnictví.

Jaké jsou možné alternativy výkonu:

Další možností ukončení neprospívajícího těhotenství je instrumentální revize dutiny děložní kyretou a vakuumexhaucí (odsátí plodového vejce) prováděné v celkové anestezii.

Prohlašuji, že mi byl náležitě objasněn důvod, předpokládaný prospěch, způsob provedení, následky i možná rizika a komplikace plánovaného výkonu. Byly mi vysvětleny možné alternativy včetně jejich komplikací a zdravotní důsledky vyplývající z nepodstoupení plánovaného výkonu. Měla jsem možnost zeptat se lékaře na všechno, co mě ve vztahu k plánovanému výkonu zajímá, a obdržela jsem vysvětlení, kterému jsem porozuměla. Lékařem jsem byla poučena o možnosti svůj souhlas s navrženým postupem odvolat.

Prohlašuji, že mi byly sestrou/porodní asistentkou náležitě objasněny veškeré informace z hlediska ošetrovatelské péče vzhledem k provedení lékařského výkonu. S provedením výše uvedeného výkonu souhlasím.

Datum:

Podpis pacientky nebo zákonného zástupce

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis ošetřujícího lékaře, který vysvětluje pohovor provedl

Razítko a podpis sestry/porodní asistentky, která vysvětluje pohovor provedla

Pacientka není schopna podpisu. Svůj souhlas vyjádřila:

popište způsob:

Jméno, příjmení a podpis svědka

Razítko oddělení, jméno, příjmení a podpis lékaře