

Česká pneumologická a ftizeologická společnost, ČLS JEP

Informace o povinném očkování dětí proti tuberkulóze (TBC)

Vážení rodiče,

u Vašeho dítěte bylo dle dostupných údajů zjištěno vyšší riziko vzniku tuberkulózy (TBC). Toto onemocnění znamená zvláště pro nejmenší děti velmi závažné zdravotní ohrožení. Očkování proti TBC významně snižuje možnost vzniku TBC včetně jejích nejzávažnějších forem a tím zásadně chrání zdraví dítěte, u kterého je zvýšeno riziko infekce TBC. U Vašeho dítěte je očkování plně indikováno podle právních předpisů, a to v co nejkratší době po narození. Výhodou brzké vakcinace proti TBC je co nejdříve navození imunity proti této nemoci a žádný nebo minimální posun dalších očkovaní. Další očkovaní lze totiž aplikovat až po zhojení reakce po TBC očkování.

Při očkování proti TBC se užívá živé oslabené vakcíny, která se podává do kůže na levé paži. Po očkování se po 6-8 týdnech obvykle objeví uzlík nebo vřídek do 10 mm v průměru v místě očkování, může se také zvětšit uzlinka v levém podpaží nebo vlevo na krku do velikosti 10 mm. V ojedinělých případech se mohou objevit větší reakce než 10 mm a zhnisání místa očkování nebo uzlin. Očkování bývá zcela výjimečně provázeno i závažnějšími reakcemi, jako je možný vývoj kostní infekce či rozsev oslabeného vakcinačního kmene v organismu dítěte u dětí se závažnou poruchou obranyschopnosti. Ani podrobným vyšetřením není možné časně po porodu předpovědět reakci po očkování. Vaše dítě však bude stále pod dohledem dětského lékaře a bude kontrolováno i na pracovišti, kde proběhlo očkování (tzv. kalmetizačním pracovišti). Případné nežádoucí reakce na očkovací látku, které by se vymykaly běžné místní reakci, co nejdříve konzultujte s těmito odborníky.

Byl jsem seznámen s nutností provedení vakcinace proti TBC u mého dítěte a s jeho přínosy a riziky

Jméno a rodné číslo dítěte

Dne

.....
podpis rodiče